



# COVID-19 Verdacht: Testkriterien und Maßnahmen

## Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte

### Erstkontakt durch Empfang/ Aufnahme

**Patient/-in:** Erhält bei respiratorischen Symptomen einen Mund-Nasen-Schutz und wird möglichst separiert

**Personal:** Trägt Schutzkleidung gemäß Risikoabwägung [www.rki.de/covid-19-hygiene](http://www.rki.de/covid-19-hygiene)



**BASIS-/HÄNDE-  
HYGIENE  
BEACHTEN**

### Prüfung der Testkriterien

- **Akute respiratorische Symptome jeder Schwere und/oder Verlust von Geruchs-/ Geschmackssinn** bei allen Patienten, insbesondere bei
  - Personal in Pflege, Arztpraxis, Krankenhaus oder
  - Angehörigen von Risikogruppen
- **Klinische oder radiologische Hinweise auf eine virale Pneumonie**  
UND Zusammenhang mit einer Häufung von Pneumonien in Pflegeeinrichtung/ Krankenhaus
- **Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall bis max. 14 Tage vor Erkrankungsbeginn**  
UND akute respiratorische Symptome jeder Schwere
- **Klinische oder radiologische Hinweise auf eine virale Pneumonie**  
UND kein Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall bei fehlender Alternativdiagnose
- **Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall bis max. 14 Tage vor Erkrankungsbeginn**  
UND jegliche mit COVID-19 vereinbare Symptome ([www.rki.de/covid-19-steckbrief](http://www.rki.de/covid-19-steckbrief))

**Meldepflichtige  
Verdachtsfälle**

### Ambulantes Management möglich?

Schwere der Erkrankung? Risikofaktoren? Umfeld? [www.rki.de/covid-19-ambulant](http://www.rki.de/covid-19-ambulant)



NEIN

JA

#### Stationäre Einweisung

Vorabinformation des Krankenhauses  
Transport gemäß  
[www.rki.de/covid-19-hygiene](http://www.rki.de/covid-19-hygiene)



#### Stationäre Diagnostik

SARS-CoV-2 PCR aus Naso-/Oropharyngealabstrich und Sputum/Trachealsekret/BAL;  
ggf. Serum-Asservierung für AK-Nachweis  
[www.rki.de/covid-19-diagnostik](http://www.rki.de/covid-19-diagnostik)



#### Ambulante Diagnostik

COVID-19 Diagnostik, weitere Diagnostik, z.B. Influenza, je nach Symptomatik und Grunderkrankung  
[www.rki.de/covid-19-diagnostik](http://www.rki.de/covid-19-diagnostik)



#### Ambulante Betreuung

Kontaktreduktion im häuslichen Umfeld bis Befundeingang;  
weiterführende Informationen siehe  
[www.rki.de/covid-19-ambulant](http://www.rki.de/covid-19-ambulant)



Bei laborbestätigtem COVID-19-Fall

### Meldung an zuständiges Gesundheitsamt

Gesundheitsamt via PLZ suchen: <https://tools.rki.de/PLZTool/>





## Im Krankenhaus

### Stationäre Behandlung

Supportive Maßnahmen entsprechend Schwere der Erkrankung  
Anwendungsempfehlung antiviraler Arzneimittel unter ständiger Aktualisierung

[www.rki.de/covid-19-therapie](http://www.rki.de/covid-19-therapie)



### Hygienemaßnahmen

Patient in Isolierzimmer, möglichst mit Vorraum  
Personal-Schutzkleidung: Einmalschutzkittel, Handschuhe, Schutzbrille, geeigneter Atemschutz

[www.rki.de/covid-19-hygiene](http://www.rki.de/covid-19-hygiene)



### Reinigung und Desinfektion

Tägliche Wischdesinfektion mit Mittel mit begrenzt viruzidem Wirkungsbereich

[www.rki.de/desinfektionsmittelliste](http://www.rki.de/desinfektionsmittelliste)

[www.rki.de/covid-19-hygiene](http://www.rki.de/covid-19-hygiene)



### Abfallentsorgung

Nicht flüssige Abfälle aus Behandlung nach AS 18 01 04 entsorgen; Abfälle aus COVID-19-Diagnostik vor Ort mit anerkanntem Verfahren desinfizieren oder AS 18 01 03\* zuordnen

<https://www.umweltbundesamt.de/covid-19-abfaelle-aus-einrichtungen-des>



### Entlassung aus Krankenhaus

[www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien](http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien)



## Im häuslichen Umfeld

### Ambulante Behandlung

Symptomatische Behandlung entsprechend Beschwerdebild; niedrigschwellige Einweisung bei Beschwerdezunahme oder ausbleibender Besserung (v.a. Fieber, Dyspnoe) nach 7-10 Tagen

[www.rki.de/covid-19-therapie](http://www.rki.de/covid-19-therapie)



### Hygienemaßnahmen

Patient in Einzelzimmer, strenge Separierung von Haushaltsangehörigen, bei Aufenthalt in demselben Raum Abstand >1,5 m und Mund-Nasen-Schutz für alle Anwesenden

[www.rki.de/covid-19-isolierung](http://www.rki.de/covid-19-isolierung)



### Reinigung und Desinfektion

Häufig benutzte Oberflächen und gemeinsam benutztes Bad täglich reinigen mit Mittel mit begrenzt viruzidem Wirkungsbereich

[www.rki.de/covid-19-isolierung](http://www.rki.de/covid-19-isolierung)



### Abfallentsorgung

Abfallsammlung in Müllsack in verschließbarem Behälter im Krankenzimmer bis Entsorgung des verschnürten Müllsacks im Restmüll

[www.rki.de/covid-19-isolierung](http://www.rki.de/covid-19-isolierung)



### Aufhebung der häuslichen Isolierung

[www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien](http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien)

