

From: "[Schaade, Lars](mailto:SchaadeL@rki.de)" <SchaadeL@rki.de>

To: "[Hamouda, Osamah](mailto:HamoudaO@rki.de)" <HamoudaO@rki.de>

["Rexroth, Ute"](mailto:RexrothU@rki.de) <RexrothU@rki.de>

["Buchholz, Udo"](mailto:BuchholzU@rki.de) <BuchholzU@rki.de>

["Haas, Walter"](mailto:HaasW@rki.de) <HaasW@rki.de>

["Buda, Silke"](mailto:BudaS@rki.de) <BudaS@rki.de>

["Eckmanns, Tim"](mailto:EckmannsT@rki.de) <EckmannsT@rki.de>

["Abu Sin, Muna"](mailto:Abu-SinM@rki.de) <Abu-SinM@rki.de>

["Antao, Esther-Maria"](mailto:AntaoE@rki.de) <AntaoE@rki.de>

["Wieler, Lothar"](mailto:WielerLH@rki.de) <WielerLH@rki.de>

Date: 4/4/2022 9:56:55 AM

Subject: WG: AKTUALISIERT: Schema zu Quarantäne- und Isolierungsdauer

Attachments: Anhang(Tabelle)Quarantäne-Isolierungsdauer_4_4_2022.pdf

...und noch eine neue Fassung für die heutige GMK

Gruß

LS

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Velter, Boris -AL -L BMG <Boris.Velter@bmg.bund.de>

Gesendet: Montag, 4. April 2022 11:47

An: Laumann, Ole -RL -L3 BMG <Ole.Laumann@bmg.bund.de>; Weisenbacher, Jasmin -L1 BMG <Jasmin.Weisenbacher@bmg.bund.de>; Reinders, Patrick -L1 BMG <Patrick.Reinders@bmg.bund.de>; Laue, Guido -RL -L1 BMG <Guido.Laue@bmg.bund.de>; Kautz, Hanno -RL -L7 BMG <Hanno.Kautz@bmg.bund.de>; Draheim Dr., Antje -St'in BMG <Antje.Draheim@bmg.bund.de>; Rottmann-Großner, Heiko -UAL -61 BMG <Heiko.Rottmann-Grossner@bmg.bund.de>; Teichert Dr. med., Ute -AL -6 BMG <Ute.Teichert@bmg.bund.de>; Steffen Dr., Thomas -St BMG <Thomas.Steffen@bmg.bund.de>; Wieler, Lothar <WielerLH@rki.de>; Schaade, Lars <Schaadel@rki.de>

Betreff: AKTUALISIERT: Schema zu Quarantäne- und Isolierungsdauer

Priorität: Hoch

Hier die aktuelle Fassung.

LG

BV

| | Vorschlag RKI, BMG | |
|---|--|---|
| | <u>Infizierte</u> | <u>(enge) Kontaktpersonen</u> |
| Allgemeine Bevölkerung | <p>5 Tage plus deutliche Symptombesserung Dringende Empfehlung: selbständige Selbstisolierung, Kontakte meiden (KEINE Anordnung)</p> <p><u>Für nachweislich positiv getestete Personen gilt die Empfehlung zur wiederholten (Selbst-)Testung beginnend nach 5 Tagen mit Antigen-Schnelltest*. Kontaktreduktion bis Test negativ.</u></p> <p><u>Gilt für Personen mit Symptomen</u> ODER Nachweis einer akuten respiratorischen Infektion jeglicher Art</p> | <p>5 Tage <u>Haushalts-Kontaktpersonen</u>, Dringende Empfehlung: selbständig Kontakte reduzieren, v.a. mit Risikogruppen für einen schweren Krankheitsverlauf (KEINE Anordnung)</p> <p><u>Empfehlung zur täglichen (Selbst)Testung mit Antigen-Schnelltest*</u></p> |
| Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten | <p>wie Allgemeinbevölkerung ABER ANGEORDNETES Tätigkeitsverbot; Voraussetzung für Wiederaufnahme: deutliche Symptombesserung UND frühestens am Tag 5 nach Symptombeginn bzw. Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion abgenommener negativer Test (Antigen-Schnelltest*/PCR-Test**)</p> | <p>wie Allgemeinbevölkerung ABER tägliche Testung mit Antigen-Schnelltest* oder NAAT*** vor Dienstantritt bis einschließlich Tag 5</p> |

* Entsprechend überprüfte Antigen-Schnelltests sind hier veröffentlicht, siehe „Tabelle 1: Ergebnisse der SARS-CoV-2 Antigenschnelltests, die das Sensitivitätskriterium erfüllen“:

www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests.pdf

** Zur Wiederaufnahme der Tätigkeit sind ein negatives PCR-Resultat oder ein positives Testresultat mit einem CT Wert >30 zulässig. D. h. es liegt ein negatives PCR-Ergebnis oder ein quantitatives PCR-Ergebnis vor, das gemäß Laborbericht für eine Viruslast unterhalb eines definierten Schwellenwertes spricht, der eine Aussage über die Anzuchtwahrscheinlichkeit erlaubt (etwa unter Bezug auf eine quantitative Bezugsprobe; Ziel: < 1.000.000 (10⁶) Kopien/ml). Dieser Wert geht oft, aber nicht immer mit einem CT-Wert von > 30 einher. Details siehe unter "Hinweise zur Testung von Patienten auf Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2" www.rki.de/covid-19-diagnostik/

***NAAT = Nukleinsäure-Amplifikationstest

Zur Isolationsdauer von Patientinnen/Patienten im stationären Bereich und von Bewohnerinnen/Bewohnern von Pflegeheimen siehe hier: www.rki.de/covid-19-entisolierung-stationaer

Zur Quarantänedauer von Patientinnen/Patienten im stationären Bereich siehe hier https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Getrennte_Patientenversorgung.html;jsessionid=79BAB762D6E5ACF9EB67D840472C108E.internet062?nn=2386228#doc14068888bodyText8 und von **Bewohnerinnen und Bewohnern von stationären Pflegeeinrichtungen** siehe [Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen](#).